

به نام ساختار دهنده هسته

# آموزش لیزرل در چند دقیقه!

کاری از: حمید مسعودی

(دانشجوی پژوهشگری علوم اجتماعی)

دانشگاه فردوسی مشهد

(خردادماه ۱۳۹۱)

:تماس با پژوهشگر

Massoudihamid@Gmail.Com

Hamidmassoudi.Com

Massoudihamid@Iran.Ir

## فهرست مطالب

۳.....	مقدمه
۴.....	اندیشه‌های اساسی‌یزیر بنای مدل‌یابی ساختاری
۵.....	توسعه‌مدل‌های علیوه‌همگرا برای روش‌های اقتصادسنجی، روان‌سنجی و ...
۶.....	موارد کاربرد روشنلیزرل
۶.....	نرم‌افزار لیزرل
۶.....	تحلیل‌عاملی اکتشافیوتاییدی
۸.....	روش‌کلیکار در الگوی معادلات ساختاری
۹.....	شروع کار با نرم‌افزار لیزرل
۲۰ .....	آزمون‌های برآورد گیمدل در معادلات ساختاری
۲۴.....	تحلیل معادلات ساختاری به صور تآنلاین

توجه **ن** حوصله مبانی نداشته و دوست دارید با کاربرد و اجرای نرم افزار لیزرل آشنا شوید از  
بسط ابتدایی رد شده و به بخش مربوطه، یعنی (**شروع کار با نرم افزار لیزرل**) رجوع کنید...

## مقدمه

مدل معادلات ساختاری و یا به طور اختصار SEM که مخفف Structural Equational Modeling (SEM) می‌باشد، از روش‌های جدید آماری و یکی از قوی‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل چندمتغیره است که برخی هم به آن تحلیل ساختاری کواریانس، الگوسازی علی و لیزرل اطلاق می‌کنند. کاربرد اصلی آن در موضوعات چند متغیره‌ای است که نمی‌توان آنها را به شیوه دو متغیری با در نظر گرفتن هربار یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته انجام داد. تجزیه و تحلیل چندمتغیره به یک سری روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاق می‌شود که ویژگی اصلی آنها، تجزیه و تحلیل همزمان چند متغیر مستقل با چند متغیر وابسته است.

به عبارت دیگر وقتی شما می‌خواهید متغیر وابسته خود به عنوان مثال بزه کاری را با متغیرهای مستقلی همچون انگیزه فردی، روابط خانوادگی، سابقه بزه‌کاری، موقعیت اجتماعی اقتصادی و از این قبیل پیش‌بینی کنید بایستی به طراحی یک مدل علی و ارزیابی آن پردازید که با استفاده از مدل‌بایی معادلات ساختاری قادر به آن خواهد بود. بنابراین شما در این پژوهش برخی از موارد را به طور مستقیم اندازه‌گیری می‌کنید (بخش اندازه‌گیری مدل) که عموماً همان گویه‌های پرسشنامه است و برخی از موارد را با ترکیب این گویه‌ها بدست آورده و روابط آنها را می‌سنجدید (بخش تحلیل مسیر مدل) تا بتوانید مدل نهایی خود را رسم کنید. این مدل در انتهای فصل مبانی پژوهش یعنی فصل دوم ارائه شده و در انتهای فصل چهارم یعنی یافته‌ها ارزیابی می‌شود.

مدل معادلات ساختاری<sup>۱</sup> SEM یک تحلیل چند متغیری بسیار نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق‌تر بسط مدل خطی کلی<sup>۲</sup> GLM<sup>۳</sup> است که به محقق امکان می‌دهد مجموعه‌ای از معادلات رگرسیون را به طور همزمان مورد آزمون قرار دهد. تحلیل مدل معادلات ساختاری را می‌توان توسط دو تکنیک انجام داد:

- تحلیل ساختاری کوواریانس یا روابط خطی ساختاری<sup>۴</sup> (LISREL).
- حداقل مربعات جزئی<sup>۵</sup> (PLS).

<sup>1</sup>Structural Equation Model (SEM).

<sup>2</sup>General Linear Model (GLM).

<sup>3</sup>LInearStructural RELations (LISREL).

<sup>4</sup>Partial Least Squares (PLS).

تکنیک لیزرل آمیزه دو تحلیل است:

- تحلیل عاملی تاییدی<sup>۱</sup>(مدل اندازه گیری<sup>۲</sup>)
- تحلیل مسیر<sup>۳</sup>- تعمیم تحلیل رگرسیون(مدل ساختاری<sup>۴</sup>)

منظور از اندازه گیری، سنجش روابط بین متغیرهای مشاهده شده(گوییه های پرسشنامه) و متغیرهای مکنون(شاخصهای اصلی مانند: سرمایه انسانی و عملکرد سازمانی و از این نوع) توسط سازه های متغیرهای مکنون(عوامل استخراج شده) است. به بیان دیگر این مدل مشخص می کند که متغیرهای مکنون چگونه با متغیرهای قابل مشاهده مرتبطاند و از طریق آنها سنجیده می شوند و هر یک از شاخص ها تا چه حد متنضم مفهوم ابعاد متغیر مکنون هستند.

### اندیشه اساسی زیربنای مدل یابی ساختاری

یکی از مفاهیم اساسی که در آمار کاربردی در سطح متوسط وجود دارد اثر انتقالهای جمع پذیر و ضرب پذیر در فهرستی از اعداد است یعنی اگر هر یک از اعداد یک فهرست در مقدار ثابت  $K$  ضرب شود میانگین اعداد در همان  $K$  ضرب می شود و به این ترتیب ، انحراف معیار استاندارد در مقدار قدر مطلق  $K$  ضرب خواهد شد. نکته این است که اگر مجموعه ای از اعداد  $X$  با مجموعه دیگری از اعداد  $Y$  طریق معادله  $= X^4 Y^4$  مرتبط باشند در این صورت واریانس  $Y$  باید  $16$  برابر واریانس  $X$  باشد و بنابراین از طریق مقایسه واریانس های  $X$  و  $Y$  می توانید به گونه غیر مستقیم این فرضیه را که  $Y$  و  $X$  از طریق معادله  $= X^4 Y^4$  با هم مرتبط هستند را بیازمایید. این اندیشه از طریق تعدادی معادلات خطی از راه های مختلف به چندین متغیر مرتبط با هم تعمیم داده می شود. هر چند قواعد آن پیچیده تر و محاسبات دشوار تر می شود. اما پیام کلی ثابت می ماند. یعنی با بررسی واریانسها و کوواریانسها متغیرها می توانید این فرضیه را که "متغیرها از طریق مجموعه ای از روابط خطی با هم مرتبط اند" را بیازمایید.

منظور از مدل ساختاری، صرفا روابط علی بین متغیرهای مکنون(پنهان)، است. به بیان دیگر هدف این مدل کشف هر دوی اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مکنون برونزا بر متغیرهای مکنون درونزا است. صورت کلی مدل ساختاری و مدل اندازه گیری در تکنیک لیزرل به صورت رابطه زیر است(جارسکوگ و ساربون، ۱۹۸۹).

$$\begin{aligned} \eta &= B\eta + \Gamma\xi + \zeta \\ E(\zeta) &= 0; \text{ COV}(\zeta) = \Psi & \left\{ \begin{array}{l} y = \Lambda_y \eta + \varepsilon \\ x = \Lambda_x \xi + \delta \end{array} \right. & \text{رابطه (1)} \\ E(\varepsilon) &= 0; \text{ COV}(\varepsilon) = \Theta_{\varepsilon} & E(\delta) &= 0; \text{ COV}(\delta) = \Theta_{\delta} \end{aligned}$$

مدل یابی با این تکنیک طی پنج مرحله تدوین مدل، شناسایی مدل، برآورد مدل، ارزیابی مدل و اصلاح مدل انجام می گیرد. نماد ماتریسی مدل لیزرل به صورت زیر است:

<sup>1</sup>Confirmatory Factor Analysis (CFA).

<sup>2</sup>Measurement Model.

<sup>3</sup>Path Analysis.

<sup>4</sup>Structural Model.

$$\eta_{per} = \alpha + \gamma_h \xi_h + \zeta_{per}$$

$$\begin{cases} p_i = \lambda_{p_i} \eta_{per} + \theta_{\varepsilon_i} & i = 1, \dots, 10 \\ h_i = \lambda_{h_i} \xi_h + \theta_{\delta_i} & i = 1, \dots, 20 \end{cases}$$

برای برآورده مدل اندازه گیری بر روی تحلیل عامل تأییدی که بخشی از الگوهای اندازه گیری است تمرکز می کنیم. این الگو در مورد نحوه سنجش متغیرهای مکنون توسط متغیرهای مشاهده شده بحث می کند و در واقع ساختار عاملی، فرضیه ای است که برای همبستگی های مشاهده شده به حساب می آید. تحلیل عاملی تأییدی از نظر جبری بسیار پیچیده است و برای هرگونه محاسباتی همیشه از لیزرل و یا برنامه های معادل آن استفاده می شود. در تحلیل عاملی تأییدی مدلی ساخته می شود که در آن فرض می شود داده های تجربی بر پایه ی چند پارامتر توصیف یا محاسبه می گردند. این مدل مبتنی بر اطلاعات قبلی درباره ساختار داده ها است، ساختاری که در قالب یک تئوری، فرضیه و یا دانش حاصل از مطالعات پیشین (همان تحلیل عاملی اکتشافی) به دست آمده است. نرم افزار لیزرل پی ساز بر سیم دل مفروض و خذداده های مربوط به متغیرها، مدلی نهایی را بهم میدهد. این مدل نهایی که قسمت اعظم تحلیل ادر بر میگیرد. در این مدل تمامی روابط مدلی ساختاری به تصویر کشیده می شود. برای هر متغیر یک ضریب تعیین نویز هو برای هر ابسط به فراخور نوع ابسط، یک ضریب بابت  $(\beta)$  یا گاما ( $\gamma$ ) ضرایب گرسیون در معادلات ساختاری بهستند:  $(\gamma)$ : ضریب گاما، ضریب ابسط علیم فروض بین متغیر مستقل و متغیر وابسته است.  $(\beta)$ : ضریب بابت، ضریب ابسط علیم فروض بین دو متغیر وابسته است (سرمد و همکاران، ۱۳۸۰).

## توسعه مدل های علی و همگرایی روش های اقتصاد سنجی، روان سنجی و...

توسعه مدل های علی متغیرهای مکنون معرف همگرایی سنتهای پژوهشی نسبتا مستقل در روان سنجی، اقتصاد سنجی، زیست شناسی و بسیاری از روش های قبل از آشناست که آنها را به شکل چهار چوبی وسیع در می آورد. مفاهیم متغیرهای مکنون<sup>1</sup> (یا پنهان) (در مقابل متغیرهای مشاهده شده<sup>2</sup> (یا آشکار)) و خطای در متغیرها، تاریخی طولانی دارد. در اقتصاد سنجی آثار جهت دار هم زمان چند متغیر بر متغیرهای دیگر، تحت برچسب مدل های معادله هم زمان بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است. در روان سنجی به عنوان تحلیل عاملی و تئوری اعتبار توسعه یافته و شالوده اساسی بسیاری از پژوهش های اندازه گیری در روان سنجی می باشد. در زیست شناسی، یک سنت مشابه همواره با مدل های معادلات هم زمان (گاه با متغیرهای مکنون) در زمینه نمایش و طرح برآورده در تحلیل مسیر سر و کار دارد.

<sup>1</sup>Latent variables

<sup>2</sup>Observed variables

## موارد کاربرد روش لیزرل

روش لیزرل ضمن آنکه ضرایب مجھول مجموعه معادلات ساختاری خطی را برآورد می‌کند برای برازش مدل‌هایی که شامل متغیرهای مکنون، خطاها و اندازه گیری در هر یک از متغیرهای وابسته و مستقل، علیت دو سویه، هم زمانی و وابستگی متقابل می‌باشد طرح ریزی گردیده است. اما این روش را می‌توان به عنوان موارد خاصی برای روش‌های تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل رگرسیون چند متغیری، تحلیل مسیر، مدل‌های اقتصادی خاص داده‌های وابسته به زمان، مدل‌های برگشت پذیر و برگشت ناپذیر برای داده‌های مقطعي / طولي، مدل‌های ساختاری کوواریانس و تحلیل چند نمونه ای (مانند آزمون فرضيه‌های برابري ماترييس کوواريانس هاي، برابري ماترييس همبستگي ها، برابري معادلات و ساختارهای عاملی و غيره) نيز به كار برد.

## نرم افزار لیزرل

لیزرل یک محصول نرم افزاری است که به منظور برآورد و آزمون مدل‌های معادلات ساختاری طراحی و از سوی "شرکت بین المللی نرم افزار علمی<sup>1</sup> به بازار عرضه شده است. این نرم افزار با استفاده از همبستگی و کوواریانس اندازه گیری شده، می‌تواند مقادیر بارهای عاملی، واریانسها و خطاها و متغیرهای مکنون را برآورد یا استنباط کند و از آن می‌توان برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی مرتبه دوم، تحلیل عاملی تاییدی و همچنین تحلیل مسیر (مدل یابی علت و معلولی با متغیرهای مکنون) استفاده کرد.

## تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی

تحلیل عاملی می‌تواند دو صورت اکتشافی و تاییدی داشته باشد. اينکه کدام یک از این دو روش باید در تحلیل عاملی به کار رود مبتنی بر هدف تحلیل داده هاست. در تحلیل اکتشافی (Exploratory factor analysis) پژوهشگر به دنبال بررسی داده‌های تجربی به منظور کشف و شناسایی شاخص‌ها و نیز روابط بین آنهاست و این کار را بدون تحمیل هر گونه مدل معینی انجام می‌دهد. به بیان دیگر تحلیل اکتشافی علاوه بر آنکه ارزش تجسسی یا پیشنهادی دارد می‌تواند ساختارساز، مدل ساز یا فرضیه ساز باشد.

تحلیل اکتشافی وقتی به کار می‌رود که پژوهشگر شواهد کافی قبلی و پیش تجربی برای تشکیل فرضیه درباره تعداد عامل‌های زیربنایی داده‌ها نداشته و به واقع مایل باشد درباره تعیین تعداد یا ماهیت عامل‌هایی که همپراشی بین متغیرها را توجیه می‌کنند داده‌ها را بکاود. بنابر این تحلیل اکتشافی بیشتر به عنوان یک روش تدوین و تولید تئوری و نه یک روش آزمون تئوری در نظر گرفته می‌شود.

<sup>1</sup>Scientific software international ([www.ssicentral.com](http://www.ssicentral.com))

تحلیل عاملی اکتشافی روشی است که اغلب برای کشف و اندازه گیری منابع مکنون پراش و همپراش در اندازه گیری‌های مشاهده شده به کار می‌رود. پژوهشگران به این واقعیت پی بردند که تحلیل عاملی اکتشافی می‌تواند در مراحل اولیه تجربه یا پژوهش تستها کاملاً مفید باشد. توانشهاي ذهنی نخستین ترسنون ، ساختار هوش گیلفوردن نمونه‌های خوبی برای این مطلب می‌باشد. اما هر چه دانش بیشتری درباره طبیعت اندازه گیری‌های روانی و اجتماعی به دست آید ممکن است کمتر به عنوان یک ابزار مفید به کار رود و حتی ممکن است بازدارنده نیز باشد.

از سوی دیگر بیشتر مطالعات ممکن است تا حدی هم اکتشافی و هم تاییدی باشند زیرا شامل متغیر معلوم و تعدادی متغیر مجھول‌اند. متغیرهای معلوم را باید با دقت زیادی انتخاب کرد تا حتی الامکان درباره متغیرهای نامعلومی که استخراج می‌شود اطلاعات بیشتری فراهم‌اید. مطلوب آن است که فرضیه‌ای که از طریق روش‌های تحلیل اکتشافی تدوین می‌شود از طریق قرار گرفتن در معرض روش‌های آماری دقیق‌تر تایید یا رد شود. تحلیل اکتشافی نیازمند نمونه‌هایی با حجم بسیار زیاد می‌باشد.

در تحلیل عاملی تاییدی (Confirmatory factor analysis)، پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که فرض می‌شود داده‌های تجربی را بر پایه چند پارامتر نسبتاً اندک، توصیف تبیین یا توجیه می‌کند. این مدل مبتنی بر اطلاعات پیش تجربی درباره ساختار داده هاست که می‌تواند به شکل: ۱) یک تئوری یا فرضیه<sup>۲</sup> ۲) یک طرح طبقه‌بندی کننده معین برای گویه‌ها یا پاره تستها در انطباق با ویژگی‌های عینی شکل و محتوا ، ۳) شرایط معلوم تجربی و یا ۴) دانش حاصل از مطالعات قبلی درباره داده‌های وسیع باشد.

تمایز مهم روش‌های تحلیل اکتشافی و تاییدی در این است که روش اکتشافی با صرفه‌ترین روش تبیین واریانس مشترک زیربنایی یک ماتریس همبستگی را مشخص می‌کند. در حالی که روش‌های تاییدی (آزمون فرضیه) تعیین می‌کنند که داده‌ها با یک ساختار عاملی معین (که در فرضیه آمده) هماهنگ‌اند یا نه.

مدل معادلات ساختاری<sup>۱</sup> SEM یک تحلیل چند متغیری بسیار نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق‌تر بسط مدل خطی کلی<sup>۲</sup> GLM است که به محقق امکان می‌دهد مجموعه‌ای از معادلات رگرسیون را به طور همزمان مورد آزمون قرار دهد. تحلیل مدل معادلات ساختاری را می‌توان توسط دو تکنیک انجام داد:

- تحلیل ساختاری کوواریانس یا روابط خطی ساختاری<sup>۳</sup> (LISREL).
- حداقل مربعات جزئی<sup>۴</sup> (PLS).

تکنیک لیزرل آمیزه دو تحلیل است:

- تحلیل عاملی تاییدی<sup>۵</sup> (مدل اندازه گیری<sup>۶</sup>).

<sup>1</sup> Structural Equation Model (SEM).

<sup>2</sup> General Linear Model (GLM).

<sup>3</sup> LinearStructural RELations (LISREL).

<sup>4</sup> Partial Least Squares (PLS).

<sup>5</sup> Confirmatory Factor Analysis (CFA).

<sup>6</sup> Measurement Model.

### • تحلیل مسیر<sup>۱</sup> - تعمیم تحلیل رگرسیون(مدل ساختاری<sup>۲</sup>)

منظور از اندازه‌گیری، سنجش روابط بین متغیرهای مشاهده شده(گوییه‌های پرسشنامه) و متغیرهای مکنون(شاخصهای اصلی مانند: سرمایه انسانی و عملکرد سازمانی و از این نوع) توسط سازه‌های متغیرهای مکنون(عوامل استخراج شده) است. به بیان دیگر این مدل مشخص می‌کند که متغیرهای مکنون چگونه با متغیرهای قابل مشاهده مرتبط‌اند و از طریق آنها سنجیده می‌شوند و هریک از شاخص‌ها تا چه حد متضمن مفهوم ابعاد متغیر مکنون هستند.

### روش کلی کار در الگوی معادلات ساختاری

آنچنان که آمد، معادلات ساختاری به عنوان یک الگوی آماری به بررسی روابط بین متغیرهای پنهان و آشکار(مشاهده شده) می‌پردازد. در واقع الگوسازی معادله ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرض‌هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و پنهان استدر الگوی معادلات ساختاری روش کار بدین صورت است که:

**۱- مشخص کردن الگویی بر پایه یک نظریه:** الگو یا مدل یک عبارت آماری درباره روابط بین متغیرها است. این الگوها در زمینه رویکردهای مختلف تحلیلی، شکل‌های مختلفی به خود می‌گیرند. در این مرحله یک الگو یا مدل بر اساس ترجمان یک نظریه به معادلات ساختاری یا ریاضی تهیه می‌شود. یعنی ابتدا یک نمودار مسیر را ترسیم کنیم و روابط علی بین متغیرها را نشان دهیم. بعد از مشخص کردن متغیرهای پنهان باید شاخص‌ها یا متغیرهای مشاهده شده مناسبی را انتخاب و به آنها وصل کنیم. بهتر است از چندین شاخص به جای یک شاخص برای اندازه‌گیری متغیر پنهان استفاده شود و این کار به کمک تعریف مفهومی و عملیاتی صورت می‌گیرد.

**۲- ارزیابی حالت تعیین مدل یا الگو:** براساس این که مدل باید مستلزم شرایطی برای بدست آوردن یک راه حل منحصر به فرد برای پارامترهای بیان شده باشد.

**۳- ارایه تخمین برای الگوی پیشنهادی:** بدست آوردن تخمین پارامترهای آزاد از روی مجموع داده‌های مشاهده شده که شامل فرآیندهای تکراری است که در هر تکرار یک ماتریس کوواریانس ضمنی ساخته می‌شود و با ماتریس کوواریانس داده‌های مشاهده شده مقایسه می‌گردد. مقایسه این دو ماتریس منجر به تولید یک ماتریس باقیمانده می‌شود و این تکرارها تا جایی ادامه می‌یابد که این ماتریس باقیمانده به حداقل ممکن برسد.

**۴- ارزیابی تناسب یا برازش الگو یا مدل:** زمانی الگو یا مدل با داده‌های مشاهده شده تناسب دارد که ماتریس کوواریانس ضمنی با ماتریس کوواریانس داده‌های مشاهده شده، معادل باشد. بدین معنی که ماتریس نزدیک صفر باشد. مهم‌ترین گام موجود در این مرحله عبارت است از: بررسی معیار کلی تناسب مدل و قابلیت آزمون‌پذیری مدل ارزیابی

<sup>1</sup>Path Analysis.

<sup>2</sup>Structural Model.

موضوع که آیا اصلاحات مورد نیاز است یا خیر؟ هنگامی که مدلی تخمین زده می‌شود، برنامه نرم‌افزاری یکسری آمارهایی از قبیل خطای استاندارد و غیره را درباره ارزیابی تناسب مدل با داده‌ها منتشر می‌کند.

**۵- اصلاح مدل:** تطبیق مدل بیان شده و تخمین زده از طریق آزاد کردن پارامترهایی که قبل اثبات بوده‌اند یا ثابت کردن پارامترهایی که قبل از آن آزاد بوده‌اند.

**۶- تفسیر مدل:** اگر آزمون‌های تناسب نشان دهنده که مدل به طور کافی متناسب با داده‌ها می‌باشد، در این مرحله ما بر روی عوامل مشخص شده (پارامترهای مدل) مدل متناسب شده تمرکز می‌نماییم. در این مرحله، معناداری پارامترهای مدل، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.<sup>۱</sup>


## شروع کار با نرم افزار لیزرل

حتماً شنیدید که یه بند خدایی میره حرم امام رضا و ازش می‌خواود که تو بانک برنده بشه و کلی التماس می‌کنه تا اینکه ندا می‌آد: فلانی برو حساب باز کن تا بشه یه کاری کرد بدون حساب که نمیشه!!! حالا شما اول بایستی نرم افزار را تهیه کنید. این نرم افزار در سایت سازنده به صورت نسخه دانشجویی عرضه شده ولی می‌توانید به تهیه ورژن نهایی آن نیز از مراکز رایانه اقدام کنید. بدون داشتن نرم افزار و کار همزمان آن با مطالعه این جزو نمی‌توانید کاری از پیش ببرید. شما می‌توانید با استفاده از لینک زیر نسخه دانشجویی (که برای تحلیل کافیه) و نسخه ۱۵ روزه را دریافت کنید:

<http://www.ssicentral.com/lisrel/downloads.html>

اگر لینک خراب بود با جستجو در اینترنت می‌توانید آنرا پیدا کنید!

با توجه به مبانی نظری خود مدل نظری را رسم کنید. فرض کنیم مدل نظری یک محقق مانند شکل زیر باشد:



<sup>۱</sup> برگرفته شده از:


هون، حیدرعلی(۳۸۴). مدل پایی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.  
نظری، رسول(۱۳۹۰). اثر مهارت‌های ارتقابی و ارتباطات بین فردی بر اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران و ارایه الگو. رساله دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده تربیت بدنی(منتشر نشده).

عبدالی، بیژن(۱۳۸۵). توانمندسازی روان شناسی کارکنان، ابعاد و اعتبارسازی بر اساس مدل معادله ساختاری. تهران: انتشارات دانشگاه تربیت معلم.

در اینجا متغیر وفاداری به برنده عنوان وابسته و باقی بعنوان مستقل شناخته می‌شوند. همچنین متغیرهای کیفیت و تصویر نیز بعنوان هم مستقل و هم وابسته و درنهایت متغیر آگاهی فقط بعنوان مستقل شناخته می‌شود. استحضار دارد که می‌توانیم در این راستا فرضیات چندی را بر شماریم، مثلاً بین آگاهی از برنده و وفاداری به برنده رابطه وجود دارد. و فرضیات دیگری که با توجه به فلش‌های موجود در نمودار قابل تشخیص است.

اما این مدل برگرفته از مبانی نظری است و محقق قصد دارد که میزان تأثیر هر کدام از متغیرهای مستقل بر روی وابسته و درنهایت برآزندگی مدل خود را ارزیابی نماید. گفتنی است که هر کدام از فلش‌ها نشان از مقداری تأثیر دارد. نکته مهم اینکه هر کدام از متغیرها با تعدادی گویه (پرسش) در پرسشنامه سنجیده شده است و هیچیک از متغیرها به طور مستقیم از پاسخگو سؤال نشده است. به همین جهت گویه‌های پرسشنامه، متغیرهای آشکار و این‌ها متغیرهای پنهان مکنون هستند.


پس بنابراین بهترین نوع نمایش مدل به صورت زیر است:




در مدل فوق متغیرهای آشکار (گویه‌ها) به صورت مربع یا مستطیل، متغیرهای مکنون یا پنهان با سازه‌ها به صورت دایره یا بیضی، خطاهای با ۴ (هم برای آشکارها و هم برای مکنون‌ها)، بار عاملی یا وزن عاملی که نشان از همبستگی و میزان باری است که یک متغیر آشکار بر روی پنهان دارد و اصولاً بایستی بیشتر از  $\beta_1 > 0.3$  باشد با  $\lambda_1$ . میزان تأثیر هر یک از متغیرها بر روی دیگری نیز با استفاده از  $\beta$  نشان داده شده است. هدف ما این است که اولاً این مقادیر را اندازه‌گیری کرده و سپس مدل را ارزیابی کنیم. همچنین متغیر پنهان آگاهی (با ۴ گویه)، تصویر (با ۵ گویه)، کیفیت (با ۵ گویه) و درنهایت وفاداری (با ۴ گویه) سنجیده شده است.

توجه: پس متوجه شدید که مدل یابی معادلات ساختاری دو بخش دارد، تحلیل عاملی (آنهم تأییدی، پس سما عامل‌ها را تأیید می‌کنید و نه اکتشاف) و سپس رگرسیون چندگانه. پس بایستی با هر دو مبحث آشنا باشید.


نرم افزار را اجرا کنید.




پس اجرای آن صفحه اصلی لیزرل به شکل زیر خواهد بود:




همانگونه که مشخص است این صفحه بسیار محیط ساده‌ای دارد. و این شما هستید که با داده‌های خود در این صفحه شروع بکار کرده و شلوغی و بی‌نظمی را در آن ایجاد می‌کنید.



با کلیک بر روی آن پنجره مربوطه باز می‌شود و شما داده‌های مورد نظر را با توجه به فرمت آن که در شکل زیر مشخص است یافته و وارد لیزرل کنید.




می‌توانید بر روی فایل داده‌ها دابل کلیک (دبار کلیک) کرده و یا با انتخاب آن گزینه Open را بزنید. پس از این کار پنجره دیگری باز می‌شود و از شما می‌خواهد داده‌ها را دوباره ذخیره کنید البته این‌بار با فرمت لیزرل یعنی (.psf). پس ادامه دهید.




داده‌ها را با هر نام دلخواهی که دوست دارید (!!!)، در هر کجایی که دوست دارید (!!!) ذخیره کنید. البته پیشنهاد ما این است که در همان پوشه‌ای که فایل داده‌های SPSS وجود دارد، می‌باشد. پس از این‌که این کار را انجام دادید صفحه ساده‌ی لیزرل به صورت زیر در می‌آید و این یعنی این‌که داده‌ها وارد لیزرل شده است و آماده کار!

	GENDER	AGE	EDUCATIO	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
1	1.000	2.000	5.000	4.000	3.000	4.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
2	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000	3.000	2.000	2.000	3.000	1.000	2.000	2.000
4	1.000	2.000	2.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5	1.000	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	3.000	1.000	2.000	2.000
6	1.000	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	3.000	1.000	2.000	1.000
7	1.000	2.000	3.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	1.000	2.000	3.000	1.000	2.000	1.000	2.000	3.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
9	1.000	2.000	3.000	1.000	2.000	1.000	2.000	3.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
10	1.000	2.000	3.000	1.000	2.000	1.000	2.000	3.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
11	1.000	2.000	3.000	1.000	2.000	1.000	2.000	3.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
12	1.000	2.000	3.000	1.000	2.000	1.000	2.000	3.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
13	1.000	2.000	3.000	1.000	2.000	1.000	2.000	3.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
14	1.000	2.000	3.000	2.000	2.000	4.000	4.000	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
15	1.000	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000	1.000	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	1.000
16	1.000	2.000	3.000	2.000	3.000	3.000	1.000	2.000	3.000	3.000	2.000	3.000	2.000
17	1.000	2.000	3.000	2.000	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
18	1.000	2.000	3.000	2.000	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
19	1.000	2.000	3.000	2.000	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
20	1.000	2.000	3.000	2.000	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
21	1.000	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
22	1.000	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
23	1.000	2.000	4.000	1.000	2.000	1.000	1.000	3.000	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
24	1.000	2.000	4.000	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000	2.000
25	1.000	2.000	4.000	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000	2.000
26	1.000	2.000	4.000	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000	2.000
27	1.000	2.000	4.000	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000	2.000
28	1.000	2.000	4.000	1.000	3.000	1.000	2.000	2.000	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
29	1.000	2.000	4.000	1.000	3.000	1.000	2.000	2.000	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
30	1.000	2.000	4.000	1.000	3.000	1.000	2.000	2.000	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
31	1.000	2.000	4.000	1.000	3.000	1.000	2.000	2.000	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
32	1.000	2.000	4.000	2.000	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000	1.000	3.000	1.000	1.000
33	1.000	2.000	4.000	2.000	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000


حال نوبت به آن می‌رسد که کمی در رابطه با گزینه‌هایی که در نوار ابزار لیزرل وجود دارد کنکاش کنید و اگر با SPSS آشنایی دارید با آنها کار کنید. در قسمت بالا گزینه‌هایی وجود دارد که به کاربر توانایی کار با داده‌ها را داده و مباحثتی را بجز بحث اصلی مدل‌یابی معادلات ساختاری بیان می‌دارد.




با کلیک راست بر روی نام متغیرها می‌توانید نام متغیر را تغییر داده و آن را به نام دلخواه تغییر دهید(همانند تصویر زیر).




همچنین در این پنجره می‌توانید داده‌های خود را اگر به صورت طیف لیکرت است به شکل فاصله درآورید تا تحلیل بهتری انجام گیرد پس این کار را صورت دهید.  
خب، اگر فراموش نکردید باشید، ما یک مدل نظری داریم و این مدل بایستی در لیزرل مورد ارزیابی قرار گیرد. پس بایستی در صفحه‌ای از لیزرل آن را رسم کنید. بنابراین بر روی (NEW) در گوشه سمت چپ بالا کلیک کنید تا پنجره آن باز شود.




پس از کلیک بر روی آن و زدن دکمه (OK) با پنجره زیر روبرو می‌شوید. در این پنجره از شما پرسیده می‌شود: نموداری را که بناست رسم کنید، می‌خواهید در کجا ذخیره کنید. شما هم به راحتی مکان آن (بهتر است در همان پوشه داده‌ها باشد) را انتخاب و ذخیره کنید. فرمت فایل‌های نموداری نیز (.pth) است.




پس از اینکار و کلیک بر روی دکمه (Save) صفحه لیزرل به شکل زیر به می‌آید و این یعنی اینکه صفحه جدیدی باز شده و شما می‌توانید مدل خود را رسم کنید.



در سمت چپ به راحتی جایگاه متغیرهای آشکار(Latent) و پنهان(Observed) و مشاهده می‌کنید. شما با استی داده‌هایی را که به لیزرل فراخوانی کرده‌اید به این بخش لینک کرده و عناوین متغیرهای آشکار را دیده و در همین مسیر متغیرهای پنهان را نیز ایجاد کنید. برای اینکار با توجه به شکل زیر بر روی گزینه Setup و پس از آن گزینه Variables کلیک کنید.




با انجام این دستور پنجره زیر باز می‌شود.




در قسمت متغیرهای آشکار با کلیک بر روی (Add/Read Variables) از پنجره باز شده بر روی (File) و در نهایت از قسمت (Browse) داده‌های خود با فرمت لیزرل(psf) را انتخاب و Ok کنید و با این کار لیست متغیرها آشکار خواهد شد. این مسیر به سادگی در شکل زیر نمایش داده شده است.

(هرگونه عدم تکثیر از این جزو ممنوع است!!!)


آموزش لیزرل در چند دقیقه!



در رابطه با متغیرهای پنهان نام اختصاری آنها را تایپ کرده و بر روی Ok کلیک کنید تا تمامی متغیرهای پنهان که چهار تا میباشد اضافه گردد. پس از اینکار پنجه (Labels) به شکل زیر ظاهر خواهد شد.



حال بر روی گزینه(Next)، کلیک کنید تا به پنجه بعد، که قرار است در آن داده های خود را به مدلی که بناست رسم کنید لینک نماید. البته اگر بنا ندارید که پیش فرض ها را تغییر دهید در همین مرحله بر روی Ok کلیک نمایید.




بهتر است که در این بخش در نوارهای باز شو همبستگی‌ها(Correlations) را انتخاب نمایید و گرنه که بدون تغییر پیش‌فرض ok کنید. با اینکار صفحه رسم دیاگرام یا مدل به شکل زیر ظاهر می‌شود. که هنوز مدلی رسم نشده ولی متغیرهای آشکار و پنهان در سمت چپ ظاهر شده است.

در این بخش بایستی متغیرهای مستقل و وابسته در بخش متغیرهای پنهان(یعنی هر سه متغیر به جز آگاهی) را انتخاب کنید(در مقابل آنها علامت ضربدر بزنید). سپس متغیرهای آشکار مربوط به متغیرهای وابسته را نیز علامت ضربدر بزنید. سپس با حوصله تمام متغیرهای آشکار و پنهان را همانند مدل تحلیلی انتخاب کرده و به سمت صفحه سفید بکشید(درج کنید). نیازی نیست که همانند مدل رسم کنید چون لیزرل پس از تحلیل مدل را دوباره سازی کرده و به شکل دلخواه خود درخواهد آورد. سپس با استفاده از نوار ابزار و بوسیله فلش متغیرها را به یکدیگر وصل کنید همانند مدل ابتدایی کار و شکل زیر به جهت فلش‌ها خیلی دقیق کنید(البته اگر اشتباه بکشید خطای داده و نمی‌توانید رسم کنید).


پس از اینکار از بخش Setup، بر روی گزینه Build SIMPLIS Syntax کلیک کنید. تا پنجره زیر باز شود.

(هرگونه عدم تکثیر از این جزو ممنوع است!!!)


آموزش لیزرل در چند دقیقه!




سپس بر روی علامت (Run lisrel) همانند تصویر کلیک کنید. در صورت اجرای صحیح مراحل با خروجی مشابه خروجی زیر روبرو خواهد شد.



حال اگر می‌خواهید بارهای عاملی را ملاحظه کنید کافیست در نوار بالا (Estimates) بر روی گزینه (solution) کلیک کنید. تا ضرایب مدل تغییر کرده و شما بتوانید به راحتی بارهای عاملی را ببینید.




حال اگر در این بخش دستور T-Value را اجرا کنید ضمن تغییر مقادیر بار عاملی ملاحظه می‌کنید که برخی از اعداد به رنگ قرمز در خواهد آمد، این بدان معناست که این روابط معنادار نیست و اگرچه تأثیر وجود دارد ولی این تأثیر معنادار نمی‌باشد. در مثال زیر، هر سه رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته معنادار نیست.



شاخص (RMSEA) که برازش مدل را نشان می‌دهد (درباره برازش مدل در ادامه بیشتر می‌خوانید) چون بالاتر از ۰/۱ است نشان می‌دهد مدل از برازش خوبی برخوردار نیست.

توجه کنید، هرگاه کاربر نیاز دارد که بین داده‌های لیزرل، مدل، کدها و ... حرکت نماید از منوهای بالای صفحه از گزینه (Window)، می‌تواند استفاده نماید.



حال می‌خواهیم سایر آزمون‌های برازش مدل را انجام دهیم، به دین جهت از بخش (Window)، بر روی فرمت (.out) کلیک کنید تا صفحه‌ی مربوط به آن باز شود. این صفحه شبیه به تصویر زیر می‌باشد که در قسمت پایین آن شما می‌توانید سایر شاخص‌های برازنده‌گی را ملاحظه فرمایید و برای بررسی وضعیت این شاخص‌ها به بخش بعدی این نوشتار رجوع نمایید.

```

LISREL for Windows - [dat.OUT]
File Edit Options Window Help
File Edit Options Window Help
Minimum Fit Function Value = 1.83
Population Discrepancy Function Value (F0) = 1.66
90 Percent Confidence Interval for F0 = (1.45 ; 1.90)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.11
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.11 ; 0.12)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 2.22
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (2.00 ; 2.48)
ECVI for Saturated Model = 0.90
ECVI for Independence Model = 20.40

Chi-Square for Independence Model with 153 Degrees of Freedom = 7755.70
Independence AIC = 7791.70
Model AIC = 848.67
Saturated AIC = 342.00
Independence CAIC = 7880.76
Model CAIC = 1056.48
Saturated CAIC = 1188.11

Normed Fit Index (NFI) = 0.91
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.91
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.77
Comparative Fit Index (CFI) = 0.93
Incremental Fit Index (IFI) = 0.93
Relative Fit Index (RFI) = 0.89

Critical N (CN) = 93.60

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.054
Standardized RMR = 0.082
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.82
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.76
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.62

Time used: 0.031 Seconds
Ready

```

## آزمون‌های برازنده‌گی مدل در معادلات ساختاری

با آنکه انواع گوناگون آزمون‌ها که به گونه کلی شاخص‌های برازنده‌گی (Fitting indexes) نامیده می‌شوند پیوسته در حال مقایسه، توسعه و تکامل می‌باشند اما هنوز درباره حتی یک آزمون بهینه نیز توافق همگانی وجود ندارد. نتیجه آن

است که مقاله‌های مختلف، شاخص‌های مختلفی را ارائه کرده اند و حتی نگارش‌های مشهور برنامه‌های SEM مانند نرم افزارهای lisrel, Amos, EQS نیز تعداد زیادی از شاخص‌های برازنده‌گی به دست می‌دهند.(همون، ۱۳۸۴، ۲۳۵).

با آنکه این اعوام گونا گون از مزمنها که همه‌گونه شاخصهای پیر از ندگی نامیده‌اند

شوند پیوسته در حال مقایسه، توسعه هر تکامل میباشد، اما هنوز درباره حتیک

آزمون بهترین توان اتفاقی مگانیو جودندار. نتیجه آن است که همه مقاله های مختلف، شاخص های مختلف را در آن می توانند.

اند و حتین گارشها یمشهور برنامه های SEM نیز تعداد زیادی از شاخص های برآزندگی مانند نرم افزار های Amos، EQS و Lisrel به دست میدهند.

پساز معین شدن مدل، طریق متعدد پیراپیر آور دنیکو پیرا از شکل یمیدلبا

دادهای مشاهده شده وجود دارد. بطور کلی چند پیشاخت خبر این سنجش بر از شمبل

مورد استفاده هقرار میگیرد ولی معمولاً برای تأیید مدل، استفاده از سه تا پنج شاخص کافی است.

## الف: شاخص (RMR)

این معیار تحقیق نوادری شهیمیانگین مجدو با قیمانده (شاخص بیرای) واریانس با قیمانده در برآز شهر پارامتر بهداده-

**باقیمانده هایگزارش شد هر مدل، بیان  
می شود.**

RMR معیار یاستبرایانداز هگیر یمتوسط باقیمانده هاوتهادرارتباط باواریانس هاوکوواریانسها قابل تغییر است. در مدلی که نیکوی بر از شخوبیدارد، این باقیمانده ها بسیار کوچک هستند، پس به طور خلاصه این معیار هر قدر کوچکتر باشد (یعنی به صفر نزدیکتر باشد) حاکی از برآذش بهتر مدل است.

ب: معیارهای (GFI) و (AGFI)

لیزر لیکشاخصنیکویی بر ازش (نسبت مجموعه مذکور اتبیین شده توسط مدله)

کلمجموعه‌ی مذکور اتماتریس برآورد شده در جامعه (محاسبه‌ی کنداین شاخص‌ها) از

لحااظم طلوبی به ضریب هم بستگی شباخته دارد. هر دو یا یک معیار هابین صفر تایک،

متغیر هستند، گرچه از لحاظ نظری ممکن است منفی باشند (البته باید چنین اتفاق بیفتد!) - چرا که حاکی از عدم برآش قطعی مدلباده-

هاست). هرچه AGFI و GFI بعده دیگر باشند، نیکویی بر از شمده لباده های مشاهده شده بیشتر است.

ج: معيار (RMSEA)

ریشه‌های مانگین‌مجذور از تقریبی باشد. این معیار به عنوان اندازه هتفاوت تراویر ایده‌آل است.

که به واقعه‌مانآزمونان حرفه‌درجه RMSEA آزادی است، برای مدل‌های یک‌به‌یارندگی خوبیداشته باشد، کمتر از ۰.۰۵

<sup>1</sup>RootMeanSquareResidual

<sup>2</sup>Adjusted Goodness of Fit Index

### <sup>3</sup>Goodness of Fit Index

<sup>4</sup>Root Mean Square Error of Approximation

است. مقادیر بالاتر از آنها  $0.1$  آنها RMAEA نشانده‌ند هخطای معقول باید رجامعه باشد. مدل‌هایی که بایشتر باشد بر از ضعیفیدارد.

#### د: معیارهای $(NFI)^1$ , $(NNFI)^2$ و $(CFI)^3$ :

شاخص NFI که شاخص بنتلر-بونت همان میدهمیشود. بنتلر و بونت ( $1980$ ) مقادیر برابر بازگذاری  $0.9$  شاخص را در مقایسه با مدل صفر، به عنوان شاخص خوب بایرازنندگی مدل‌ها یعنی توصیه کردند، در حالی که برخی از پژوهشگران نتفه بشد  $0.80$ . رابه‌کار می‌برند. شاخص دیگر، شاخص تاکر - لویی است که در بیشتر موارد شاخص نرم شده برازنده  $(NNFI)$  نامیده می‌شود. این شاخص مشابه NFI است اما برای پیچیدگی مدل جریمه می‌پردازد. چون دامنه‌ای نمدلمحدود به صفو و یک نیست تفسیر آن نسبت به NFI دشوارتر است. بر پایه قرداد مقادیر کمتر از  $0.90$  آن مستلزم تجدیدنظر در مدل است. شاخص CFI بزرگتر از  $0.9$  داشت. برای قبول نشانه بر از ندگی مدل لاست. این شاخص از طریق مقایسه با مدل پیشنهادی موجود نظر، مقدار بهبود را نیز می‌آماید. این نیست با مدل پیشنهادی موجود است بلکه بر این نهاد مبنای دهد.

پس بنابراین، این آزمون‌ها به این سؤال پاسخ می‌دهند که مدل مورد نظر چقدر خوب و برازنده‌ی داده‌های پژوهش است. از این آزمون‌ها به مشهورترین آنها یعنی آزمون‌های نیکوبی برازش اشاره می‌شود. اگرچه این آزمون‌ها بر آزمون کای اسکوئر مبتنی هستند ولی در کنار آن ذکر می‌شوند. جدول شماره یک چکیده‌ای از این آزمون‌ها می‌باشد. خیلی به فلسفه این آزمون‌ها فکر نکنید فقط مدل را با مقادیر آنها ارزیابی کنید!!!

جدول شماره (۱): خلاصه‌ی آزمون‌های برازنده‌ی مدل در معادلات ساختاری

ردیف	نام آزمون	معیار اصلی	چه زمانی مدل برازنده است؟	توضیحات
۱	$\chi^2$	تفاوت فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار	معنادار باشد (بزرگتر از میزان جدول)	حساس به حجم نمونه
۲	RMR	واریانس باقیمانده و کوواریانس	هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد.	Root Mean Square Residual
۳	GFI	ارزیابی مقدار نسبی واریانس و کوواریانس	بین صفر و یک. باید برابر یا بزرگتر از $0.9$ باشد.	Goodness of fit index
۴	AGFI	میانگین مجذورات به جای مجموع مجذورات در مدل بالا	بین صفر و یک. باید برابر یا بزرگتر از $0.9$ باشد.	Adjusted Goodness of Fit Index
۵	RMSEA	خطای مجموع مجذورات میانگین	اگر کوچکتر از $0.1$ باشد.	Root Mean Square Error of Approximation
۶	NFI	مقایسه مدل مورد نظر با مدل بدون رابطه‌هایش	باید بزرگتر از $0.9$ باشد.	شاخص بنتلر بونت

<sup>1</sup>Comparative Fit Index

<sup>2</sup>Non-Normed Fit Index

<sup>3</sup>Normed Fit Index

(هرگونه **عدم تکثیر** از این جزوی ممنوع است!!!)

آموزش لیزرل در چند دقیقه!

-	باید بزرگتر از ۰/۹ باشد.	مقایسه مدل مورد نظر با مدل بدون رابطه هایش	<b>CFI</b>	%
---	--------------------------	--	------------	---

البته آزمون های بیشتری در این رابطه وجود دارد و بحث اجمالی آن را در جای دیگر دنبال کنید!


## تحلیل معادلات ساختاری به صورت آنلاین

امروزه اینترنت توافسته است با همکاری شرکت‌های بزرگ و در نتیجه برقراری ارتباط بین یک نرم افزار و فضای مجازی تحلیل‌های کاربردی را ارائه دهد. مزیت این کار در این است که هرگاه به اینترنت دسترسی داشتید ولی نرم افزار لیزرل بر روی سیستم‌تان نصب نبود از این روش استفاده کنید.

وارد سایت زیر شوید:

<http://www.sem-gesca.org/>

پس از ورود در وسط صفحه بر روی گزینه [ENTER GeSCA] کلیک کنید تا پنجره آن در صفحه‌ای دیگر باز شود. توجه داشته باشید که با استی ورزن جدید نرم افزا جاوا را بر روی سیستم خود نصب کرده باشید و گرنه قدر به ادامه کار نخواهید بود.



کار با این سایت بسیار ساده بوده و نیازمند کمی تأمل و همچنین یادگیری کامل بخش‌های قبل است. البته از راهنمای سایت نیز کمک بخواهید.

آرزومندم این نوشتار مورد رضایت عرضه شده و نتما بیژوهنتگر عزیز کمال

استفاده را از آن بخواهید. از نتما خواهمندم درصورتی که از این نوشتار استفاده نمودید حافظه

اخیار سه تفریقیار دهم و هر گاه سوال داشتید با من در میان بگذارید، امیدوارم که بنوانم کمک در این

حمدی مسعود (۰۳/۱۳۹۱)

را بخواهید.

<sup>۱</sup> با تشکر از آقای دکتر اصغرپور ماسوله به جهت معرفی این سایت.